

PRODUCTO

BAYFOLAN® AMBITION

TIPO DE PRODUCTO

Fertilizante Foliar

EMPAQUE COMERCIALIZADO

1, 20 y 200 L

ELEMENTOS / CONCENTRACIÓN

B (0,05%) + Mn (0,50%) + Zn (1,50%) + Aminoácidos y Péptidos(59,6%) + Ácidos Fúlvicos (2,5%)

NÚMERO DE REGISTRO NACIONAL

País	Y	NÚMERO DE REGISTRO
COSTA RICA		11467
NICARAGUA		BY-109Q-2023
PANAMA		11347
EL SALVADOR		FE2023082685
HONDURAS		4022-2938-V
GUATEMALA		33-F-7792-46

BENEFICIOS

- **Bayfolan Ambition** es un fertilizante foliar que contiene elementos importantes para la planta como Calcio, Zinc, Manganeseo y Boro así como aminoácidos, péptidos y ácidos fúlvicos que bioestimula los procesos metabólicos relacionados con el crecimiento y la producción de los cultivos, así como en la respuesta antiestrés de las plantas.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Respetar las recomendaciones definidas en la etiqueta.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Indicaciones de Uso:

Vierta la mitad de agua en la aspersora, tonel o tanque mezclador, agregue la dosis de BAYFOLAN AMBITION y mezcle, finalmente agregue el resto del agua para completar el volumen de mezcla. Si se aplica con insecticidas y/o fungicidas foliares el BAYFOLAN AMBITION deberá ser el último producto adicionado en el orden de la mezcla. Se recomienda que el pH de la solución de aplicación se de 6.5 a 7.5.

USOS APROBADOS: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

CULTIVO O FAMILIA	Número de aplicaciones y momento de aplicación	Volumen de Mezcla L/ha (L/mz)
Banano Musa acuminata Musa paradisiaca	En plantación en producción se recomienda hacer aplicaciones cada 45 días. En plantillo se recomienda realizar 2 aplicaciones, al inicio de la floración (racimo 0 semanas) y en crecimiento del fruto.	200– 400 L/ha (140- 280 L/mz) Aéreo 18-28 L/ha (12,6 - 19,6 L/mz)
Piña Ananas comosus	1-2 aplicaciones en etapa vegetativa y 2 aplicaciones post-floración.	700-2000 L/ha (490 - 1400 L/mz)
Arroz Oryza sativa	2 aplicaciones: la primera al inicio de macollamiento y segunda al máximo embuchamiento.	200– 400 L/ha (140- 280 L/mz) Aéreo 20-40 L/ha (14- 28 L/mz)
Maíz Zea mays	2 aplicaciones. La primera en estado vegetativo de 12 a 18 días (V3 a V4) y la segunda de 25 a 30 días (V7 a V8)	200– 400 L/ha (140- 280 L/mz)
Café Coffea arabica	Se recomienda realizar 3 aplicaciones, la primera en prefloración, y las dos siguientes para llenado del fruto.	200– 400 L/ha (140- 280 L/mz)
Cultivos Hortícolas de fruto y tubérculo como: tomate, papa, chile, pepino, melón, sandía, cebolla, arveja, ejotes, etc.	3 aplicaciones, la primera en crecimiento vegetativo; segunda al inicio de la floración y la tercera en desarrollo del fruto.	400 - 600 L/ha (280 - 420 L/mz)
Hortalizas de hoja como lechuga, brócoli, repollo, etc.	2- 3 aplicaciones durante el crecimiento vegetativo.	200– 400 L/ha (140- 280 L/mz)

Frutales General como mango, aguacate, papaya, cítricos, etc.	2-3 aplicaciones postfloración para el desarrollo del fruto.	500– 1000 L/ha (3500- 700 L/mz)
---	---	------------------------------------

USOS APROBADOS: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

CULTIVO O FAMILIA	Número de aplicaciones y momento de aplicación	Volumen de Mezcla L/ha (L/mz)
Ornamentales de follaje	3 aplicaciones por ciclo de cultivo.	500– 1000 L/ha (3500- 700 L/mz)
Ornamentales de flor	3 aplicaciones: Primera, al establecimiento del cultivo (cuando aplique), en cultivo establecido al inicio de brotación, segunda aplicación al inicio de formación del botón floral y tercera ó siguientes aplicaciones cuando aparezcan otros botones florales.	500– 1000 L/ha (3500- 700 L/mz)
Otros cultivos	2-3 aplicaciones por ciclo de cultivo	200– 400 L/ha (140- 280 L/mz)

DOSIS GENERAL:

1-1,5 L/ha (0,7 - 1,05 L/mz)

En Piña de 1-2 L/ha (0,7 - 1,4 L/mz)

La cantidad de mezcla depende del cultivo y su estado fenológico y calibración del equipo de aplicación.



INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

INCOMPATIBILIDAD: Evite combinarse con productos o soluciones de pH muy alcalinos mayores de 7. Se recomienda realizar una prueba previa para verificar la compatibilidad con otros productos.

FITOTOXICIDAD: Cuando se usa a las dosis recomendadas no causa fitotoxicidad. No se recomienda hacer mezclas de tanque con productos que contengan cobre..



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar BAYFOLAN AMBITION bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor, la luz o el fuego directo. Conserve o almacene en su envase original y debidamente etiquetado. No transporte ni almacene junto con medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, forrajes o productos químicos. No es corrosivo, no es explosivo, ni inflamable.

No almacenar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 45°C o bajo la luz solar directa durante períodos prolongados de tiempo y almacenar con condiciones de Humedad Relativa menores del 50%.

El producto no tiene ninguna reacción sobre el material de los envases utilizados para su almacenamiento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por ingestión: No provocar vómito, enjuague la boca con suficiente agua y busque ayuda médica. Llevar al médico o centro de salud más cercano.

Por contacto con los ojos: Lave inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Llevar al médico o centro de salud más cercano.

Por contacto con la piel: Enjuagar con suficiente con agua y acudir al médico en caso de irritación. Llevar al médico o centro de salud más cercano.

Por inhalación: Retirar al paciente a un lugar fresco y ventilado. Llevar al médico o centro de salud más cercano.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

MEDIDAS DE MITIGACIÓN (PROTECCIÓN AL AMBIENTE): No contamine fuentes de agua, ríos, lagos, estanques, etc. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agréguela a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes.



**** LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE ENVASES LOCAL, LUEGO DE
REALIZAR EL TRIPLE LAVADO ****

